

	FICHE D'INSTRUCTION	Référence : FIC-PRE-8
	Recueil coprologie-parasitologie	Version , indice 8 0

Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques.
et de préférence à distance de tout traitement.

Un seul examen parasitologique des selles n'a pas de valeur s'il est négatif. C'est la raison pour laquelle, en cas d'examen négatif, il est suggéré de répéter l'analyse

- Recueillir la totalité de la selle dans le flacon stérile fourni par le laboratoire. La selle doit être fraîchement émise (selle du jour).
- Si le recueil s'effectue à partir d'une couche, donner au parent un flacon stérile avec spatule pour qu'il y transvase la selle avant dépôt au laboratoire.
- Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et l'heure du recueil.
- La personne présente à l'accueil s'assure que la feuille de renseignements cliniques est correctement remplie et vérifie la cohérence des informations. Elle propose son aide, le cas échéant.
- En cas de doute, elle prévient le biologiste qui décidera de la pertinence du prélèvement et proposera le cas échéant une autre date (si possible).
- En cas de difficulté d'obtention d'une selle, Il est possible de réaliser un écouvillonnage rectal au laboratoire (uniquement pour la coprologie).
- Coprologie : la selle, ainsi que le Fecal swab après transfert, doivent être conservés entre 2°C et 8°C et parvenir au plateau technique dans les 24heures.
- Parasitologie : la selle, après transfert en tube pré-rempli, doit être conservée entre 2°C et 8°C sauf si recherche d'Anguillules auquel cas la selles doit être envoyée sur le plateau technique de microbiologie le jour du recueil à température ambiante.